MC1 Mg
MC2 Al
MC3 Fe
MC4 Co
MC5 Cu
MC6 Ac/Ba
MC7 C
MC8 spectro
MC9 couleur
MC10 solvant

MC10 : Le solvant en chimie

(In) : Déf° IUPAC = Substance d'1 solvant traitée ≠ment des autres appelés solutés (Sv^t excès) – Sv^t utilisé en X et important car influence sur la Rx – ∃ ≠ paramètres liés = proticité (ρ, H), moment dipolaire et ε_r permittivité relative – (lien 2 = polarité).
(Ob) : Illustrer les prop. et l'influence de paramètres.

I – Propriétés

1) Interact° avec 1 soluté (1h30) Daumarie p125/JFLM1. / Fosset p115.

Manip : Coefficient de partage de I_2 ds Cy et H_2O
Rq : Faire 1 seul mélange – Couleur violette I_2 ds Cy
• Préparat° sol° + agitat° 30min + décantat° → 2 φ
Dosage / $S_2O_3^{2-}$ ac ajout thiodène avant équiv. → C ac I_2.

◁ Chute de burette pr dosage + décantat° (V_e) – Calcul de K et incertitudes.

Discours : Ve pr chaq dosage ds φ aqueuse et φ orga.
Calcul de $[I_2]$ et dét. de K – Incertitudes + sources d'erreurs.
ε_r → I_2 66 x ⊕ soluble ds (C_6H_{12} q H_2O) car mol apolaire ($\mu = 0$ D).
I_2 ds eau : ajout I^- → I_3^-.
$[I_2] = V_e [Na_2S_2O_3] / 2 V_{I_2}$. Dosage iodométrig.

Tr : Très utilisé en X orga également et choix dépend des prop.

2) Traitement et caractérisat° de composés (1h) Daumarie p53 / MG JFLM2

Manip : Synthèse de l'aspirine. Montage au reflux
Traitement : filtrat° sur Büchner → choix solvant pr lavage et Recri → choix pr dissoudre impuretés (↳ solubilités (EtOH)) Voir MC8
Caractérisat° : CCM = choix solvant élut° (interact° φ mobile ac composé → structure + polarité + proticité), IR, Tf.

◁ : Interprétat° spectres + Caractérisat° (CCM, IR, Tf) + filtrat° sur Büchner + lavages + Montage Recri. + Calcul de rendem^t et incertitudes – Srces erreurs.

Discours : Equat° de Rx + mécanisme – Influence du solvant à chaq étape. Rq : RTN $CHCl_3$ → Ø H (solvant)

Tr : Utilisat° de ces prop. en chimie orga et gén° d'orienter les Rx.

II – Influence du solvant sur la réactivité

1) Sur la cinétiq (2h) Daumarie pH – Bl p167

Manip : Solvolyse du chlorure de tBuCl.
≠ mélanges → faire seulem^t influence solvant (⊘ ⊖) ∧ Bl ↳ explicat° Paulsses – Regarder ε_r (de pr à dissociant) et (de la polarité). Acétone = aprotiq H_2O = protiq
Latis Pro → σ = f(t) → Regressi. Ajout tBuCl = pipet + Δt = 2min (20 pts – 1200s) → ∀ min. CONDUCTIMÉTRIE

◁ Lancem^t acquisit° après ajout tBuCl sur 1 min – Ajout pr sur la crbe $\ln((\sigma_\infty - \sigma_0)/(\sigma_\infty - \sigma_t))$ → Cadre 1 + Calcul k
$\ln[tBuCl] = f(t)$ → droite de pente k –

Discours : Rx ⊕ rapide si ε_r ⊕ gd (H_2O) car solvant stabilise les espèces chargées (C⊕).
I2 (C+) → Postulat de Hammond : ET dont l'NRJ détermine la cinétiq de Rx (loi d'Arrhénius) est ⊕ ou ⊖ stabilisé selon le solvant (eau+). Diag. d'NRJ. Guggenheim – $\varepsilon_{r,H_2O} = 78$, $\varepsilon_{r,AC} = 20$

Tr : Ss contrôle cinétiq le solvant influence l'ET + cinétiq – Donc possible d'utiliser pr discriminer 2 chemins réactionnels concurrents

2) Sur la régiosélectivité (2h) JD67 p262.

Manip : C10 alkylat°
⚠ Mettre 2 à 3 fois ⊕ de tout ! Ne pas hésiter à mettre la base en excès pr bien déprotoner. Remplacer le lavage ac NH_4Cl / 1 lavage basiq pr la ⊖ alkylat°.

◁ Précipitat°, essorage, lavage, IR.

Discours : Equat° de Rx, effet cage du DMSO sur le cat° (contrôle cinétiq) le DMSO = solvant aprotiq → Ø de l'° avec l'⊖ et le laisse ds réagir → Contrôle de charge = ⊖ alkylat°.
le trifluoroéthanol = protiq avec protons durs → empêche ⊖ de réagir – Théorie HSAB. (F) → C alkylat° (contrôle orbitalaire)
DMSO = produit insoluble et précipite → Ø besoin évapo rotat° (Teb élevée pr DMSO)

(CCL) : Solvant = composant maj. d'1 et omniprésent ds étapes de Rx – Utilisé pr influencer paramètres d'1 Rx : Es sélectivité ou cinétiq
Fcts = Mise en contact réact^ts, homogénéisat° (c, ⊖), dissipat° ⊖, ...
Today : On tend à le limiter (surtout volatiles) car déchets ou toxiq ou nocifs pr environnement → coûte cher et ne respecte Ø χ verte (Eco